

EIN REVOLUTIONÄRES, KORRIGIERENDES SERUM, DASS DEN HYALURONSÄUREGEHALT DER HAUT ERHÖHT.

H.A. Intensifier ist eine mehrfach wirksame Formel mit einer hohen Konzentration an reiner Hyaluronsäure (HA), Proxylan und lila Reisextrakt die den natürlichen Hyaluronsäuregehalt der Haut unterstützen und Volumen, Elastizität und Festigkeit erneuern. Das Erscheinungsbild von Krähenfüßen, Nasolabialfalten und Marionettenlinien wird verringert und das Hautbild sichtbar geglättet.



1,0% PROXYLANE

- Unterstützt den hauteigenen Hyaluronsäuregehalt
- Hilft, den Zusammenhalt der Hautmatrix zu unterstützen und verbessert die Festigkeit

2,0% DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE + 0,2% LILA REISEXTRAKT

- Dipotassium Glycyrrhizate ist der Hauptbestandteil der Süßholzwurzel und lila Reisextrakt ist eine Reisart, die aus China kommt
- Zusammen helfen diese Inhaltsstoffe, den Hyaluronsäuregehalt in der Haut zu erhalten

1,3% HYALURONSÄURE

- Eine Kombination aus Hyaluronsäure mit vollem Molekulargewicht, fragmentierter Hyaluronsäure und verkapselten Ketten
- Diese Kombination sorgt für lang anhaltende Feuchtigkeit und für eine verbesserte Hauttextur

SKINCEUTICALS

ADVANCED PROFESSIONAL SKINCARE

H.A. INTENSIFIER – INTEGRATED SKINCARE

PROBLEM	PFLEGEPROGRAMM FÜR ZUHAUSE		
ERSTE ANZEICHEN LICHTBEDINGTER HAUALTERUNG	ANTIOXIDANS	H.A. INTENSIFIER + METACELL RENEWAL B ₃	LICHTSCHUTZ
FALTEN UND SCHLAFTE HAUT	ANTIOXIDANS	H.A. INTENSIFIER + A.G.E INTERRUPTER	LICHTSCHUTZ
TROCKENE HAUT UND VERLUST VON STRAHLKRAFT	ANTIOXIDANS	H.A. INTENSIFIER + TRIPLE LIPID RESTORE 2:4:2	LICHTSCHUTZ

PROFESSIONELLE BEHANDLUNGEN

Nach ärztlichem Ermessen ist der H.A. Intensifier als Pflege nach Injektionen (z. B. Filler) anwendbar.

SKINCEUTICALS

HYALURONIC ACID INTENSIFIER

DAS KORRIGIERENDE SERUM ERHÖHT DEN HAUTEIGENEN HYALURONSÄUREGEHALT UM 30%

- | VERBESSERTE **FESTIGKEIT**
- | NEU DEFINIERTE **SPANNKRAFT**
- | ERNEUERTES **VOLUMEN**



DIE ROLLE VON HYALURONSÄURE IN DER HAUT

Hyaluronsäure spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung biomechanischer Eigenschaften der Haut und ist ein sehr leistungsfähiges, natürliches Feuchthaltemittel.

DIE ABNEHMENDE LEBENSDAUER VON HYALURONSÄURE

Hyaluronsäure hat in der Haut nur eine kurze Lebensdauer und baut sich alle 24 Stunden um 30% bis 50% ab. Mit dem Alter nimmt der der Hyaluronsäuregehalt der Haut allmählich ab. Die Produktion verringert sich bereits mit Anfang/Mitte 20. Ab 40 nimmt dieser Abbau deutlich zu. Die Kombination von Rückgang und schnellem Abbau der Hyaluronsäure trägt zu ersten Hautalterungsanzeichen bei.



MITTE 20	30 UND 40 JAHRE	50+
<ul style="list-style-type: none"> • feine Linien • fahle, stumpfe Haut 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Volumen beginnt sich auf die untere Gesichtshälfte zu verlagern • ausgeprägtere Falten um Augen und Mund herum • raue, unebene Haut 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung der Falten • Verlust von Straffheit und herabfallen der Wangenpartie • raue, unebenmäßige Haut

Stern R., Maibach H.I., Hyaluronan in skin: aspects of aging and its pharmacologic modulation, Clin Dermatol, 2008. 26(2):106-122. Frantz, C., Stewart, K.M. & Weaver, V.M., The extracellular matrix at a glance, Journal of Cell Science, 2010. 123(24), 4195-4200.

ERGEBNISSE

1. NACHGEWIESENER ANSTIEG DES HYALURONSÄUREGHALTES

Im Rahmen einer 4-wöchigen Studie stieg der Hyaluronsäuregehalt mit H.A. Intensifier um **+30%** an.

Protokoll: eine 4-wöchige Studie bei 12 Frauen im Alter von 45 bis 65 Jahren. Die Lokalisierung der Hyaluronsäure wurde unter Verwendung von einem biotinylierten Hyaluronsäure-Bindungsprotein und Streptavidin-konjugierten Meerrettich-Peroxidase sichtbar gemacht.

2. DEUTLICHE VERBESSERUNG DER ALLGEMEINEN STRAFFHEIT DER GESICHTSHAUT

Die 3D-Darstellung entspricht einer qualitativen Methode, mit der die Veränderung der prallen Haut zu verschiedenen Zeitpunkten veranschaulicht wird. Bei dieser Analyse wurde der Schwerpunkt auf den Wangenbereich gelegt.

Die folgenden 3D-Bilder verdeutlichen eine kontinuierlich verbesserte pralle Gesichtshaut zwischen Studienbeginn und der 12. Woche.



DURCHSCHNITTLICHE Ergebnisse für pralle Gesichtshaut

GRÖSSE DER VERÄNDERUNG



Protokoll: eine 12-wöchige Studie bei 30 Frauen im Alter von 40 bis 60. H.A. Intensifier wurde zweimal täglich zusammen mit einem Sonnenschutz verwendet. Die Bilder der Streifenprojektion wurden zu Beginn und in der 12. Woche mit einem AEVA-HE-System aufgenommen.

3. KLINISCHE VERBESSERUNG BEI DEN WICHTIGSTEN ANZEICHEN DER HAUTALTERUNG



23%
PRALLERE HAUT

9%
ABNAHME DER HAUTERSCHLAFUNG

11%
VERBESSERUNG DER FESTIGKEIT

13%
VERBESSERUNG DER HAUTELASTIZITÄT

18%
VERBESSERUNG DER HAUTTEXTUR



DURCHSCHNITTLICHE Ergebnisse bei Marionettenlinien und Nasolabialfalten

Protokoll: eine 12-wöchige monozentrische klinische Studie der Gesichtshaut wurde bei 59 Frauen, im Alter von 42 bis 60 Jahren, mit schwacher bis moderater Schläffheit und Verlust der Hautfestigkeit, rauer Hauttextur, Nasolabialfalten, Marionettenfalten und feinen Linien/Falten im Bereich der seitlichen Augenpartie (Krähenfüße) durchgeführt. H.A. Intensifier wurde zweimal täglich zusammen mit Gentle Cleanser und einem Sonnenschutz verwendet. Die Bewertungen von Wirksamkeit und Verträglichkeit wurden zu Beginn und in den Wochen 4, 8 und 12 durchgeführt.